

HEAMOPHILUS INFLUENZAE SZCZEPIONKA TYPU b (Hib)

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT ?

1. Jaka chorobą jest choroba Hib ?

Heamophilus influenzae typu b (Hib) jest bardzo poważną chorobą wywołaną przez bakterię. Choroba ta zazwyczaj atakuje dzieci poniżej 5 roku życia.

Twoje dziecko może zostać zarażone Hib przez kontakt z dziećmi lub dorosłymi, którzy są nosicielami tej bakterii (nic o tym nie wiedząc). Choroba przenosi się z osoby na osobę. Bakteria, która zatrzyma się w gardle lub nosie dziecka najprawdopodobniej nie wywoła choroby. Bakteria, która dostanie się do płuc lub obiegu krwionośnego jest natomiast bardzo groźna.

W USA przed wprowadzeniem szczepionki Hib, choroba Hib była głównym powodem zapalenia opon mózgowych (bacterial meningitis) u dzieci poniżej 5 roku życia. Zapalenie opon mózgowych jest infekcją mózgu i obudowy rdzenia kręgosłupa.

Infekcja ta może doprowadzić do uszkodzenia mózgu i utraty słuchu.

Choroba Hib może także spowodować:

- zapalenie płuc
- silną opuchliznę gardła utrudniającą oddychanie
- infekcję krwi, stawów, kości i obudowy serca
- zgon

Przed wprowadzeniem szczepionki Hib, w USA każdego roku około 20000 dzieci poniżej 5 roku życia poważnie chorowało na tą chorobę i około 1000 umierało.

Szczepionka Hib może zabezpieczyć Ciebie przed chorobą Hib.

Ilość dzieci chorujących na Hib znacznie by wzrosła gdyby zaniechano szczepień.



2. Kto i kiedy powinien być zaszczepiony szczepionką Hib ?

Dzieci powinny być zaszczepione szczepionką Hib w wieku:

- √ 2 miesiący
- √ 4 miesiący
- √ 6 miesięcy*
- √ 12-15 miesięcy

* W zależności jaki rodzaj szczepionki jest używany istnieje możliwość, że dawka w wieku 6 miesięcy będzie zbyt duża. Twój lekarz lub pielęgniarka poinformuje Ciebie o tym.

Jeżeli opuścisz lub spóźnisz się ze szczepieniem, kontynuuj dalsze dawki. Nie ma potrzeby powtarzania szczepień od początku.

Szczepionka Hib może być podawana równocześnie z innymi szczepionkami.

Starsze dzieci i dorośli

Dzieci powyżej 5 roku życia zazwyczaj nie potrzebują być zaszczepione szczepionką Hib. Dzieci i dorośli ze specjalnymi zdrowotnymi problemami powinni być zaszczepieni. Do tych poważnych zdrowotnych problemów zaliczamy: niedokrwistość sierpowatą, HIV/AIDS, usunięcie śledziony, wymiana szpiku kostnego albo rak leczony lekami. Poproś swojego lekarza lub pielęgniarkę o więcej informacji na ten temat.

3. Osoby, które powinny zaniechać lub odłożyć szczepienie szczepionką Hib:

- osoby, które miały zagrażającą życiu reakcję do poprzedniej szczepionki Hib powinny zaniechać dalszego szczepienia
- dzieci w wieku poniżej 6 tygodni nie powinny być zaszczepione szczepionką Hib
- osoby chorujące lub obłożnie chore powinny poczekać ze szczepieniem szczepionką Hib do czasu powrotu do zdrowia

Poproś swojego lekarza lub pielęgniarkę o więcej informacji na ten temat.

4. Ryzyko związane ze szczepieniem szczepionką Hib?

Szczepionka ta jak każde lekarstwo może wywołać poważne problemy jak np. ostrą reakcję alergiczną. Ryzyko poważnych powikłań lub zgonu spowodowanych szczepionką Hib jest znikome.

Większość zaszczepionych osób przechodzi szczepienie bez żadnych problemów.

LEKKIE REAKCJE

- zaczerwienienie, opuchlizna i podniesiona temperatura skóry w miejscu szczepienia (do ¼ zaszczepionych dzieci)
- gorączka ponad 101° F (do 1 dziecka na 20)

Objawy te, jeśli występują, to zdarzają się w przeciągu jednego dnia po zastrzyku i mogą trwać przez 2-3 dni.



5. Co robić w wypadku silniejszej i bardzo poważnej reakcji?

Na co powinniśmy zwrócić uwagę ?

Zwracamy uwagę na niecodzienne symptomy takie jak: silna alergia, wysoka gorączka lub zmiana zachowania. Objawami alergii może być problem z oddychaniem, chrypliwy głos, świszczący oddech, wysypka, bledność, osłabienie, szybkie bicie serca i zawroty głowy. Objawy te występują od kilku minut do paru godzin po szczepieniu.

Co Powinniśmy zrobić?

- natychmiast telefonicznie, lub osobiście skontaktować się z lekarzem
- podać lekarzowi wszystkie dane łącznie z datą wystąpienia objawów i szczepienia
- poprosić lekarza, pielęgniarkę lub urząd zdrowia o wypełnienie formularza: „Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)”; można również zawiadomić VAERS osobiście dzwoniąc na numer 1-800-822-7967

6. Rządowy program odszkodowań

W przypadku gdy osoba dorosła lub dziecko dozna poważnych obrażeń spowodowanych szczepionką, rządowy program może pomóc w opłaceniu kosztów poniesionych przy opiece nad poszkodowaną osobą.

Informacje o tym programie znajdziesz pod:
„The National Vaccine Injury Compensation Program” # 1-800-338-2382 lub na internecie -
<http://www.hrsa.gov/bhpr/vicp/>

7. Jak uzyskać więcej informacji ?

- Twój lekarz lub pielęgniarka może zaoferować publikacje na ten temat albo zasugerować inne źródła informacji
- zatelefonuj do lokalnego lub stanowego urzędu szczepień
- skontaktuj się z centralnym biurem chorób zakaźnych i ich zapobiegania - „Center for Disease Control and Prevention (CDC) „
 - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 - na internecie odwiedź stronę rządowego programu szczepień - „National Immunization Programs”
<http://www.cdc.gov/nip/>



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Hib - Polish 12/16/98

Translation provided by Danusia Filipowski, MD, of Walnut Creek, California with review by Marek Bentkowski, MD, and Chris Kinel, MD, of Chicago, IL.